

Наркотики. Характерные признаки их употребления.

Конопля (анаша, гашиш, марихуана, план). Марихуана - это высушенные измельченные цветы и листья определенных видов конопли. Гашиш - смола, полученная из того же растения, выглядит как коричневая твердая маслянистая масса. Используются обычно путем курения, в смеси с табаком.

При курении конопли:

- Первое, что бросается в глаза - "зависание" (заторможенность восприятия);
- Рассеянность, замедленные реакции;
- Иногда, когда он говорит, вы просто перестаете его понимать;
- Ненасытность в еде, сильное чувство голода ("жор");
- Беспричинный смех, хохот ("невозможность остановиться");
- Сухость во рту;
- Учащенное сердцебиение.

Примечание: Существует неверное представление, что нет привыкания к "траве", что не бывает "похмельного синдрома" ("ломки", абстиненции), в действительности есть, как и привыкание с увеличением доз, так и ломка при "выходе из употребления".

При вдыхании ингаляторов (клей "Момент", бензин, ацетон):

- Эйфория (повышенное настроение);
- Характерный запах;
- Тюбик в кармане;
- Нарушение ориентации времени и пространства;
- Затуманенность во взоре;
- Припадки смеха;
- Речь или вялая, или слишком быстрая, в обоих случаях невнятная и маловыразительная;

Поскольку страдает в первую очередь мозг, то нарушаются все его функции: память, внимание, мышление, он буквально тупеет на глазах, хотя при этом остается высокая самооценка.

"Экстази" (белые, красные, розовые таблетки круглой формы с вдавленным рисунком - серп и молот, торговый знак "Мерседес", стилизованный зайчик и т.д.). Так называют синтетический препарат, обладающий эффектами психостимуляторов и галлюциногенов, употребляется через рот.

При употреблении "экстази":

- Сверхвозбужденное состояние (прилив энергии, быстрая речь, желание двигаться);
- Блеск в глазах, расширенные зрачки;
- Изменение сексуального поведения;
- Сильная сухость во рту;
- Нарушение координации движений.

Примечание: При постоянном употреблении "экстази" появляется восприимчивость к различным заболеваниям, потеря веса, душевные расстройства, бессонница и даже паранойя (приступы сверхъестественного ужаса, нерегулярны, но тяжелы).

Амфетамин (металефетамин, метамфетамин, эфедрон). Амфетамины имеют форму капсул, таблеток или бело-желтого порошка который не только нюхают, но и вводят внутривенно.

При употреблении амфетаминов:

- Многочасовая активность, эйфория;
- Желание двигаться;
- Бессонница;
- Изменение сексуального поведения.

Примечание: Длительная, до двух дней после приема, депрессия (расплата за пятнадцать часов возбуждения), снижение аппетита, параноидальное состояние.

Кокаин (порошок) — это белый кристаллический порошок, который иногда смешивают с другими веществами, например, с сахаром.

При употреблении кокаина:

- Красный, распухший нос;
- Шаткость походки;
- Смазанная речь;
- Мелкое дрожание радужки глаз;
- Самоуверенность;
- Сексуальная расторможенность.

Примечание: Отмена наркотика вызывает дрожание языка, век, вытянутых рук, тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение, зрительные галлюцинации (кто-то лезет в окно и т.д.), манию преследования.

Галлюциногены (ЛСД, псилоцибин, псилоцин, мескалин, марки, грибы, кислота)

Наиболее известные галлюциногены: LSD обычно применяют через рот: наркотик, которым пропитали кусочек бумаги ("марки"), всасывается через слизистую оболочку полости рта. Грибы-поганки, содержащие активное вещество псилоцибин едят в любом (в том числе, и в сыром) виде.

При употреблении галлюциногенов:

- Отчужденность;
- Галлюцинации;
- Расширенные зрачки;
- Потливость;
- Сухость во рту;
- Истерия, паранойя;
- Наличие грибов на тонкой ножке;
- Изменение сердечного ритма;
- Употребляющему непонятны элементарные вещи.

Примечание: Особо опасные наркотики, т.к. под их воздействием происходит непредсказуемое поведение, очень часто - летальные исходы.

Опиаты (ханка, опий, морфин, героин, мак). К наркотикам этой группы относят как натуральные производные опийного мака (морфин и кодеин), так и синтетические соединения (героин, метадон и др.) Порошок разных оттенков - от белого до коричневого, на 80 % разбавленный всем, чем угодно: от сахарной пудры до стирального порошка, используется различными путями: вдыхание и курение обычно

на начальных этапах потребления, инъекции - на более поздних.

При употреблении опиатов:

- Уменьшение чувства страха;
- Благодушность;
- Прилив энергии, эйфория;
- Бледность или землистость кожи;
- Холодный пот;
- Сухость во рту;
- При употреблении - узкие зрачки, при лишении наркотика - широкие;
- Боли в суставах, ногах, спине;
- Твердый и редкий кал;
- Снижение сексуального влечения.

Барбитураты (колеса). Группа лекарственных веществ, производных барбитуровой кислоты, обладающих снотворным, противосудорожным и наркотическим действием, обусловленным угнетающим влиянием на центральную нервную систему.

При употреблении барбитуратов:

- Сонливость, вялость;
- Наличие различных таблеток;
- Депрессия, раздражительность;
- Ослабление памяти;
- Монотонная речь, такое ощущение, что разговариваете с роботом;
- Бессонница;
- Нарушение менструального цикла.

Психостимуляторы (эфедрон, первитин) группа наркотиков, оказывающих возбуждающее действие на нервную систему. К ним относятся производные эфедрина, синтетический аналог эфедрина - амфетамин. Производные эфедрина и фенилпропаноламина (вещества, входящего в состав некоторых противопростудных лекарственных препаратов, свободно продающихся в аптечной сети) вводятся внутривенно, иногда - до 10 раз в сутки, чаще всего в группе.

Некоторые наркотики из группы психостимуляторов курят или вдыхают.

При употреблении психостимуляторов:

- Навязчивое поведение;
- Суперговорливость;
- Повышенная активность в движениях;
- Бледность кожи;
- Резкое сильное похудание.

Примечание: Такие же признаки, как и при употреблении амфетаминов.

При приеме снотворных препаратов:

Похоже на алкогольное опьянение. Речь невнятная, заплетаящаяся. Бывает сухость во рту. Координация движений нарушена. При приеме некоторых снотворных препаратов в больших дозах могут быть — галлюцинации.